

## BIPACKSEDEL/ANVÄNDARINFORMATION

### 1 LÄKEMEDELTS NAMN, LÄKEMEDELFORM OCH STYRKA

Activeen

### 2 VAD INNEHÅLLER ACTIVEEN ?

1 tablett innehåller:

Extrakt av pollen (*Zea mays* L. (majs), *Secale cereale* L. (råg), *Dactylis glomerata* L. (hundäxing), *Pinus sylvestris* L. (tall)) och pistill (*Zea mays* L. (majs)) 68 mg.

Övriga innehållsämnen:

Mikrokristallin cellulosa, vattenfri kalciumvätefosfat, maltodextrin, spraytorkad akaciagummi, polysorbat 20, magnesiumstearat, kolidial vattenfri kiseldioxid, shellack, talk.

Vid tillverkning av en tablett åtgår ca 90 mg torkat pollen

### 3 HUR VERKAR ACTIVEEN ?

Verkningsmekanismen för Activeen är ofullständigt känd.

### 4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

Natumin Pharma AB, Kungsängsvägen 27, 561 51 Huskvarna

Information lämnas av:

Medica Egenvård Försäljnings AB, Datorgatan 4, 561 33 Huskvarna, tel 036-387470, info@medicaegenvard.se.

### 5 VAD ANVÄNDS ACTIVEEN FÖR?

Traditionellt använt som stärkande medel vid trötthet och svaghetskänsla och vid nedsatt aptit.

### 6 NÄR SKA ACTIVEEN INTE ANVÄNDAS?

Dokumentation för ställningstagande till detta saknas.

#### ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR ACTIVEEN ANVÄNDS:

Vid långvarig trötthet och svaghetskänsla som inte förbättras under behandlingen eller om biverkningar som inte nämns under rubriken Biverkningar uppkommer bör läkare kontaktas för att undersöka bakomliggande orsak.

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttagas vid behandling.

#### GRAVIDITET

Användning under graviditet kan inte rekommenderas.

#### AMNING

Användning under amning kan inte rekommenderas.

## **TRAFIKVARNING**

Inga kända risker.

## **VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER ACTIVEEN?**

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.

## **7 DOSERINGSANVISNING**

*Vuxna och barn över 12 år:*

1-2 tabletter 2 gånger dagligen vid behov.

Tabletterna sväljes hela med ett glas vatten i samband med måltid.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

## **VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR STOR DOS?**

Om Du fått i Dig för stor mängd av Activeen, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

## **8 VILKA BIVERKNINGAR KAN ACTIVEEN GE?**

I sällsynta fall har allergiska reaktioner samt mag-tarmbesvär rapporterats. Kontakta läkare om du misstänker allvarliga biverkningar i samband med användandet av Activeen.

## **9 HUR SKA ACTIVEEN FÖRVARAS?**

Förvaras vid högst 25° C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

## **10 VILKEN HÅLLBARHET HAR ACTIVEEN?**

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

## **11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN**

2007-01-24