

BIPACKSEDEL

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Eskimo-3, kapslar

2 VAD INNEHÅLLER ESKIMO-3?

1 kapsel innehåller: fiskolja 496 mg, innehållande 170 mg omega-3 fettsyror som triglycerider, varav eikosapentaensyra (EPA) 80 mg och dokosahexaensyra (DHA) 54 mg. E-vitamin, askorbylpalmitat (fettlösligt C-vitamin), lecitin, aromämnen, gelatin och glycerol.

3 HUR VERKAR ESKIMO-3?

Verknings sättet inte fullt klarlagt.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

Cardinova AB
Ullforsgatan 15
752 28 Uppsala
Tel: 018-55 80 00

Information lämnas av:
Green Medicine AB
Tegelgårdsgatan 11
211 33 Malmö
Telefon:040-22 29 50

5 VAD ANVÄNDS ESKIMO-3 FÖR?

Naturläkemedel innehållande omega-3 fettsyror, som kan bidra till skydd mot hjärt-kärlsjukdomar.

6 NÄR SKA ESKIMO-3 INTE ANVÄNDAS?

Dokumentation för ställningstagande saknas. Personer med ärftlig blödarsjuka bör ej använda preparatet.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR ESKIMO-3 ANVÄNDS:

Omega-3 fettsyror kan leda till en viss förlängning av blödningstiden. Personer som använder blodförtunnande medel (Apekumarol, Waran, Heparin) eller acetylsalicylsyra (Bamycor, Trombyl, Magnecyl m fl) bör därför rådgöra med läkare innan behandling med Eskimo-3 påbörjas.

GRAVIDITET

Användning under graviditeten kan inte rekommenderas.

AMNING

Användning under amning kan inte rekommenderas.

TRAFIKVARNING

Inga kända risker.

VAD SKA DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER ESKIMO-3?

Tillägg av Eskimo-3 till behandling med antikoagulantia eller acetylsalicylsyra kan förlänga blödningstiden. Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerat.

7 HUR SKA DU ANVÄNDA ESKIMO-3?

Vuxna och barn över 12 år:

3 kapslar 1-3 gånger dagligen till måltid.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

VAD SKA MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR STOR DOS?

Om du fått i dig en mycket stor mängd av preparatet kontakta Giftinformationscentralen (tel 112), läkare eller sjukhus för bedömning av risken samt rådgivning.

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN ESKIMO-3 GE?

Milda mag- tarmbesvär t.ex. rapningar, uppstötningar med fisksmak och övergående lös avföring. Kontakta läkare om du misstänker att naturläkemedlet gett allvarliga biverkningar.

9 HUR SKA ESKIMO-3 FÖRVARAS?

Preparatet bör förvaras i skydd för ljus i kartongen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR ESKIMO-3?

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2010-12-22